

## Common Toxicity Criteria, CTC Version 2.0 Revideret 23 Marts, 1998

R:\Personale\GITTE\CarboTaxGem\CTC-dansk.doc

CTC-kode	Toxicity	Grad 0	Grad 1	Grad 2	Grad 3	Grad 4
BM04	Hemoglobin (Hgb)	normal	< LNV – 6,1 mmol/l	4,8 - < 6,1 mmol/l	3,9 - < 4,8 mmol/l	< 3,9 mmol/l
BM07	Leukocytal (WBC)	normal	< LNV - 3.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥2.0 - < 3.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥1.0 - < 2.0 x 10 <sup>9</sup> /L	1.0 x 10 <sup>9</sup> /L
BM12	Neutrocytal (ANC)	normal	≥1.5 - <2.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥1.0 - <1.5 x 10 <sup>9</sup> /L	≥0.5 - <1.0 x 10 <sup>9</sup> /L	<0.5 x 10 <sup>9</sup> /L
BM15	Trombocytal	normal	< LNV- <75.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥50.0- < 75.0 x 10 <sup>9</sup> /L	≥10.0- < 50.0 x 10 <sup>9</sup> /L	< 10.0 x 10 <sup>9</sup> /L
BM20	Transfusion	ingen	-	-	ja	-
RG02	P-Creatinin	normal	> ØNV - 1.5 x ØNV	> 1.5 - 3.0 x ØNV	> 3.0 - 6.0 x ØNV	> 6.0 x ØNV
HP02	Bilirubin	ØNV	> ØNV - 1.5 x ØNV	> 1.5 - 3.0 x ØNV	> 3.0 - 10.0 x ØNV	> 10.0 x ØNV
AH02	Indre øre / hørelse	normal	høretab kun erkendt v. audiometri	tinnitus el. høretab, som ikke kræver beh. el. høreapparat	tinnitus el. høretab, som kan korrigeres v. beh. el. høreapparat.	alvorlig uni- el. bilateral høretab (døvhed), ikke til at korrigeres.
AI01	Hypersensitivitet	ingen	forbigående udslæt, drug feber < 38°C	urticaria, drug feber ≥ 38°C, og/el. asymptomatiske bronkospasmer	symptomatiske bronkospasmer, som kræver i.v. medicin, med el. uden urticaria; allergi-relateret ødem/ angioødem	anafylaxi
CS01	Træthed	ingen	tiltagende træthed efter beh.start, men bevarer normalt aktivitetsniveau	moderat træthed (fald i performance status m. 1 niveau iflg. ECOG) besvær med at udføre visse aktiviteter	alvorlig træthed (fald i performance status m. ≥ 2 niveauer iflg. ECOG) <u>el.</u> ude af stand til at udføre visse færdigheder	sengeliggende el. uarbejdsdygtig / invalideret
CG06	Ødem	ingen	asymptomatisk, ikke behandlingskrævende	symptomatisk, behandlingskrævende	symptomatisk ødem begrænser funktion responderer ikke på behandling el. kræver afbrydelse af kemoterapi	anasarca (alvorligt generelt ødem)
DS01	Hårtab	normal	mildt hårtab	udtalt hårtab	-	-
GI04	Obstipation	ingen	kræver blødgørende medicin (magnesia/laktulose) el. kostændring	kræver laxantia (laxoberal o. lign)	kræver manual udtømning el. lavement	obstruktion el. toksisk megacolon
GI06	Diarrhoea Pat. uden kolostomi	ingen	øgning m. < 4 aff./dag siden beh. start	4-6 aff./dag el. natlige aff.	≥ 7 aff./dag el. inkontinens; el. behov for iv. væsker for dehydrering	fysiologiske konsekvenser; kræver intensiv pleje; el. hæmodynamisk kollaps
GI25	Kvalme	ingen	kan spise	indtag p.o. markant forringet	intet indtag p.o. af betydning	-
GI34	Opkastning	ingen	1 episode i døgnet	2-5 episoder i døgnet	≥ 6 episoder i døgnet; eller behov for iv. Væske	Behov for parenteral ernæring; eller fysiologiske konsekvenser, som kræver intensive behandling; hæmodynamisk kollaps
GI30	Stomatitis / Mucositis	ingen	sår uden smerter, rødme el. Ømhed uden læsioner	smertefuld erythem, ødem, el. sår, kan spise / synke	smertefuld erythem, ødem, el. sår, kræver iv. væsker	alvorlig ulceration el. behov for parenteral- el. sondeernæring el. profylaktisk intubation
IN02	Febril neutropeni	ingen	-	-	til stede	livstruende sepsis (septisk chok)
	<i>(Feber af ukendt oprindelse, uden klinisk el. mikrobiologisk dokumenteret infektion (ANC &lt; 1.0 x 10<sup>9</sup>/L, feber ≥38.5°C)</i>					
IN05	Infektion uden neutropeni	ingen	mild, ingen aktiv behandling	moderat, lokaliseret infektion, behov for lokal el. peroral behandling	alvorlig, systemisk infektion, kræver iv. antibiotisk- el. antiseptiskbehandling, el. hospitalisering	livstruende sepsis (septisk chok)
NY19	Neuropati-motorisk	normal	subjektiv svækkelse men ingen objektive fund	mild objektiv svækkelse som influerer på funktions-evne, men ikke på daglige aktiviteter	objektiv svækkelse som influerer på daglige aktiviteter	paralyse
NY20	Neuropati-sensorisk	normal	tab af dybe reflekser el. paræstesier (prikken/snurren) influerer ikke på funktionsevne	objektivt sensorisk tab el. paræstesier (prikken/snurren), influerer på funktions-evne, men ikke på daglige aktiviteter	sensorisk tab el. paræstesier influerer på daglige aktiviteter	permanent sensorisk tab, som influerer alvorligt på funktionsevne
NY28	Svimmelhed	ingen	uden indflydelse på funktionsevne	influerer på funktions-evne, men ikke på daglige aktiviteter	influerer på daglige aktiviteter	sengeliggende el. uarbejdsdygtig/invalideret
PN02	Artralgi	ingen	mild smerte uden indflydelse på funktionsevne	moderat smerte; smerte el. analgetika influerer på funktionsevne, men ikke på daglige aktiviteter	svær smerte: smerte el. analgetika influerer alvorligt på daglige aktiviteter	invaliderende
PN10	Myalgi	ingen	mild smerte uden indflydelse på funktionsevne	moderat smerte; smerte el. analgetika influerer på funktionsevne, men ikke på daglige aktiviteter	svær smerte: smerte el. analgetika influerer alvorligt på daglige aktiviteter	invaliderende